

7

その他の検査

受診団体の依頼により、次の検査を実施した。

1 腹部超音波検査

受診団体数	受診者数	異常認めず (%)	精検不要 (%)	要精検 (%)
62	1,637	374 (22.8)	1,208 (73.8)	55 (3.4)

2 胃がんリスク評価

性別	受診者数	異常認めず (%)		要精検 (%)			
		A群 (%)	B群 (%)	C群 (%)	D群 (%)	B+C+D群 (%)	
男	1,753	1,550 (88.4)	151 (8.6)	36 (2.1)	16 (0.9)	203 (11.6)	
女	658	547 (83.1)	75 (11.4)	29 (4.4)	7 (1.1)	111 (16.9)	
総数	2,411	2,097 (87.0)	226 (9.3)	65 (2.7)	23 (1.0)	314 (13.0)	

3 ペプシノゲン検査 (単独)

受診団体数	受診者数	異常認めず (%)	要精検 (%)
26	979	940 (96.0)	39 (4.0)

4 ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 (単独)

受診団体数	受診者数	異常認めず (%)	要精検 (%)
22	263	215 (81.7)	48 (18.3)

【ペプシノゲン判定基準】

判定	判定基準
異常認めず	PG I > 70.0ng/mL 又は PG I / II 比 > 3.0
要精検	PG I ≤ 70.0ng/mL かつ PG I / II 比 ≤ 3.0

【ヘリコバクター・ピロリ抗体検査基準】

判定	判定基準
異常認めず	9.0U/mL以下
要精検	10.0U/mL以上