

5

結核検診

1 概要

1] 検査方法

胸部エックス線デジタル撮影による背腹1方向撮影

2] 判定方法

呼吸器の専門医が二重読影を行い判定した。

なお、二重読影は第一、第二読影を独立して行った。

2 実施状況

表1 性・年齢階級別判定内訳

| | 受診者数 | 異常認めず(%) | 精検不要(%) | 要精検(%) | |
|----|--------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 男 | 19歳以下 | 748 | 732 (97.9) | 12 (1.6) | 4 (0.5) |
| | 20～24歳 | 3,702 | 3,583 (96.8) | 104 (2.8) | 15 (0.4) |
| | 25～29歳 | 4,452 | 4,268 (95.9) | 171 (3.8) | 13 (0.3) |
| | 30～34歳 | 4,413 | 4,170 (94.5) | 224 (5.1) | 19 (0.4) |
| | 35～39歳 | 4,274 | 3,960 (92.7) | 288 (6.7) | 26 (0.6) |
| | 40～44歳 | 4,306 | 3,818 (88.7) | 439 (10.2) | 49 (1.1) |
| | 45～49歳 | 4,790 | 4,165 (87.0) | 565 (11.8) | 60 (1.3) |
| | 50～54歳 | 4,479 | 3,701 (82.6) | 700 (15.6) | 78 (1.7) |
| | 55～59歳 | 4,264 | 3,336 (78.2) | 820 (19.2) | 108 (2.5) |
| | 60歳以上 | 5,688 | 3,999 (70.3) | 1,416 (24.9) | 273 (4.8) |
| 計 | 41,116 | 35,732 (86.9) | 4,739 (11.5) | 645 (1.6) | |
| 女 | 19歳以下 | 477 | 456 (95.6) | 15 (3.1) | 6 (1.3) |
| | 20～24歳 | 2,496 | 2,399 (96.1) | 85 (3.4) | 12 (0.5) |
| | 25～29歳 | 2,826 | 2,734 (96.7) | 77 (2.7) | 15 (0.5) |
| | 30～34歳 | 2,393 | 2,285 (95.5) | 99 (4.1) | 9 (0.4) |
| | 35～39歳 | 2,497 | 2,386 (95.6) | 97 (3.9) | 14 (0.6) |
| | 40～44歳 | 2,859 | 2,680 (93.7) | 161 (5.6) | 18 (0.6) |
| | 45～49歳 | 3,655 | 3,324 (90.9) | 296 (8.1) | 35 (1.0) |
| | 50～54歳 | 3,214 | 2,818 (87.7) | 342 (10.6) | 54 (1.7) |
| | 55～59歳 | 2,967 | 2,475 (83.4) | 439 (14.8) | 53 (1.8) |
| | 60歳以上 | 4,014 | 2,889 (72.0) | 918 (22.9) | 207 (5.2) |
| 計 | 27,398 | 24,446 (89.2) | 2,529 (9.2) | 423 (1.5) | |
| 総数 | 68,514 | 60,178 (87.8) | 7,268 (10.6) | 1,068 (1.6) | |